

# Mehrfachverwenden von Schutzmasken in der Betreuung

*Diese Empfehlung ist vom Robert Koch-Institut (RKI) in Abstimmung mit dem Ad-Hoc-Arbeitskreis zum SARS-CoV2 des Ausschusses für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) erstellt worden. Stand 21.02.2020 und gültig solange eine Notfallsituation für diesen Bereich beschrieben wird, vorläufig bis zum 31. August 2020*

**Bitte beachten Sie, dass die folgend beschriebenen Maßnahmen eine erhöhte Kontaminationsgefahr und ein höheres Infektionsrisiko aufweisen.**

**Sie sind daher ausdrücklich nur auf offiziell ausgerufene Notfallsituationen anzuwenden, wenn [FFP-Masken](#) nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen und nur die Möglichkeit besteht, auf bereits benutzte Masken zurückzugreifen.**

## **Voraussetzung zum Wiederverwenden:**

Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregertaltig und beim erneuten Aufsetzen muss eine Kontamination des Trägers insbesondere im Bereich Gesicht (Nase, Mund, Augen) vermieden werden. Daher:

- Maßnahmen zur Weiterverwendung gebrauchter Masken müssen unterwiesen werden
- Diese Informationen sind am Ort der Anwendung gut lesbar aufzuhängen
- Masken sind vor der Erstnutzung zu markieren und damit eindeutig einer Person zuzuordnen, um Verwechslungen zu vermeiden
- Masken dürfen nur von der Person wiederverwendet werden, die sie auch vorher benutzt hat
- Masken, deren Innenfläche durch Fehler bei der Handhabung möglicherweise (Verdachtsfall) mit einem Erreger kontaminiert wurden, müssen sofort in die dafür bereitstehende Sammelbox entsorgt werden.

## **Bei der Wiederverwendung ist insbesondere darauf zu achten:**

- Das Absetzen der Maske muss so erfolgen, dass hierdurch eine Kontamination der Maske (vor allem der Innenseite) bzw. eine Kontamination des Gesichtes verhindert wird,
  - d.h. – vor Absetzen der Maske die behandschuhten Hände gut desinfizieren oder
  - 2 Paar Handschuhe übereinander ziehen und das obere Paar vor Berühren von Maske und evtl. Gesicht abstreifen.
- nach dem Absetzen der Maske diese vor dem Patientenzimmer **trocken, an der Luft** (nicht in geschlossenen Behältern!) so aufbewahren, dass eine Kontamination

der Innenseite der Maske aber auch die Verschleppung von Keimen auf andere Oberflächen vermieden werden

- die [Handschuhe](#) anschließend fachgerecht entsorgen und die Hände desinfizieren
- benutzte FFP-Masken nicht mit Desinfektionsmittel reinigen/bearbeiten!!
- [beim erneuten Anziehen der Maske](#) saubere Handschuhe tragen und darauf achten, dass eine Verschleppung der Erreger von der kontaminierten Außenfläche auf die Innenfläche verhindert wird.  
Das Berühren der Innenseite des Filtervlieses ist daher zu vermeiden!!
- auf den richtigen Sitz der gebrauchten Maske achten (ohne das Gesicht zu berühren)
- der Ort, an dem die Zwischenlagerung erfolgte, ist unmittelbar nach Entnahme der Maske sachgerecht zu desinfizieren.

### **Zu beachten:**

- Masken und Mund-Nase-Schutz, deren Innenfläche durch Fehler bei der Handhabung möglicherweise (Verdachtsfall) mit einem Erreger kontaminiert wurde, müssen aus präventiver Sicht sofort fachgerecht entsorgen werden.

### **Wie oft wiederverwenden:**

Bis auf weiteres sollen FFP2-Masken gewechselt werden:

- Bei normaler Nutzung (Vollversorgung einer Person) nach einer Arbeitsschicht
- bei geringer Nutzungszeit (gesamt unter 30 Minuten) spätestens nach zwei Arbeitsschichten
- wenn sie durchfeuchtet sind
- wenn sie an der Innenseite kontaminiert wurden

---

Diese Schutzmaßnahmen gelten nur im Falle und für die Dauer einer Knappheit von Atemschutzmasken und sind keinesfalls als mögliche Alternative zu sonst gültigen Hygienerichtlinien zu verstehen.